



تاریخ: ۱۴۰۲/۰۹/۲۰

شماره: ۲۸/۳۶/۱۹۳۸۹۹

پیوست: دارد

۱۴:۲۴

رئیس محترم مرکز آموزشی درمانی بوعلی سینا-ولایت-قدس-کوثر-شهیدر جایی-۲۲ بهمن
رئیس محترم بیمارستان رحیمیان-شفا-شهدا-امیرالمومنین^(ع)
رئیس محترم بیمارستان تامین اجتماعی رازی-ناکستان
رئیس محترم بیمارستان خصوصی مهرگان-پاستور-دهخدا-ولیعصر^(ع)
رئیس محترم کلینیک های ویژه دانشگاه
رئیس محترم سازمان نظام پزشکی قزوین

با سلام و احترام

عطف به نامه شماره ۳۷/۱۰۹۷۲۶ تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۵ معاون محترم بهداشت دانشگاه منضم به نامه شماره ۳۰۰/۱۵۸۹۳ تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۱ در خصوص "تشخیص به موقع موارد مشکوک به بیماری تب کریمه کنگو در اتباع و رعایت احتیاطات خاص در تماس با آنها"، ضمن پیوست جدول معیارهای تشخیص بالینی بیماری به استحضار می‌رساند دستورالعمل کشوری مدیریت پیشگیری و کنترل تب خونریزی‌دهنده کریمه کنگو (CCHF) در پورتال معاونت درمان قابل دسترسی می‌باشد. لذا خواهشمند است دستور فرمایید جهت بهره‌برداری از راهنمای ابلاغی به آدرس ذیل مراجعه نمایند.

<http://vct.qums.ac.ir>

دسترسی سریع آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها آئین نامه‌های امور بیمارستانها آئین نامه‌های امور بیماریها بیماری‌های واگیردار

دکتر عبدالله کشاورز
معاون درمان دانشگاه

جدول معیارهای تشخیص بالینی تب خونریزی دهنده کریمه کنگو

(R Swanepoel , JH Mynhardt Harvey – 1987)

در این جدول سه موضوع مورد بررسی قرار می گیرد:

- ۱- سابقه تماس با عفونت
- ۲- نشانه ها و علائم بیماری
- ۳- یافته های آزمایشگاهی در طی ۵ روز اول بیماری

نکته: چنان چه جمع امتیازات ۱۲ و یا بیشتر شود، مورد به عنوان مورد محتمل CCHF تلقی شده و تحت درمان قرار می گیرد.

۱- سابقه تماس با عفونت (یکی از موارد زیر)		
بیشتر از یک هفته	کمتر از یک هفته	موارد
*۲	۳	گزش کنه، یا له کردن کنه با دست بدون پوشش (بدون دستکش یا حفاظ)
یا		
**۲	*۳	تماس مستقیم با خون تازه و یا سایر بافت های دام ها یا حیوان ها
یا		
۲	۳	تماس مستقیم با بیمار یا خون، ترشحات یا مواد دفعی بیمار تایید شده یا محتمل CCHF (شامل ورود سوزن آلوده به بدن)
یا		
۱	۲	اقامت یا مسافرت در یک محیط روستایی که احتمال تماس با دام یا کنه وجود داشته، اما بروز یک تماس خاص تصادفی را نمی توان مشخص نمود.

*سیاه زخم و تب دره ریفت را باید در نظر داشت.

**تب مالت، تب کیو و سیاه زخم را باید در نظر داشت.

۲- نشانه ها و علائم بیماری	
۱	شروع ناگهانی
۱	تب بیشتر از ۳۸ c حداقل برای یکبار
۱	سردرد شدید
۱	درد عضلانی
۱	حالت تهوع یا بدون استفراغ
۳	تمایل به خونریزی : (راش پنتشی، اکیموز، خونریزی از بینی) استفراغ خونی، هماچوری یا ملنا

۳- نتایج آزمایشات	
۱	لکوپنی کمتر از ۳۰۰۰ در میلی متر مکعب یا لکوسیتوز بیشتر از ۹۰۰۰ در میلی متر مکعب
۱	ترمبوسیتوپنی (پلاکت کمتر از ۱۵۰۰۰۰ در میلی متر مکعب)
۲	(پلاکت کمتر از ۱۰۰۰۰۰ در میلی متر مکعب)
۱	یا کاهش ۵۰ درصد گلبول های سفید یا پلاکت ها در طی ۳ روز اول
۱	PT غیر طبیعی
۱	PTT غیر طبیعی
-	افزایش ترانس آمینازها
۱	اسپاراتات آمینوترانسفراز (AST) بیشتر از ۱۰۰ واحد در لیتر
۱	آلانین آمینو ترانسفراز (ALT) بیشتر از ۱۰۰ واحد در لیتر