



تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۲۰

شماره: ۲۸/۳۶/۱۷۸۳۹۸

پوست: دارد

۰۷:۴۶

مدیر عامل محترم مرکز آموزشی درمانی مستقل بوعلی سینا- ولایت
رئیس محترم مرکز آموزشی درمانی قدس- کوثر- شهیدر جایی- ۲۲ بهمن
رئیس محترم بیمارستان رحیمیان- شفا- شهدا- امیرالمومنین (ع)
رئیس محترم بیمارستان تامین اجتماعی رازی- تاکستان
رئیس محترم بیمارستان خصوصی مهرگان- پاستور- دهخدا- ولیعصر (ج)
رئیس محترم سازمان نظام پزشکی قزوین

با سلام و احترام

به پیوست نامه شماره ۳۷/۹۹۵۶۲ د تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ معاون محترم فنی
مرکز بهداشت استان مبنی بر " لزوم رعایت اندیکاسیون های تجویز داروی
ضد ویروسی اوسلتامیویر در بیماران مشکوک به آنفولانزا " جهت استحضار و اقدام
لازم ارسال می گردد.

دکتر عبدالله کشاورز
معاون درمان دانشگاه

شماره: ۳۰۴/۱۲۷۰۷

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۱۲

پیوست ندارد



جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی



تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین
مقام معظم رهبری

معاون محترم بهداشت دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ...

موضوع: لزوم رعایت اندیکاسیون های تجویز داروی ضد ویروسی اوسلتامیویر در بیماران مشکوک به

آنفلوانزا-مهر ۱۴۰۱

با سلام و احترام

پیرو نامه ۳۰۰/۲۰۶۶۳ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۷ و در راستای برنامه مراقبت بیماری آنفلوانزا در کشور و با توجه به فصل افزایش بروز بیماری و همچنین سوالات مکرر همکاران در سطوح محیطی، خواهشمند است موارد زیر به منظور مصرف بموقع و صحیح داروی ضد ویروسی اوسلتامیویر در بیماران با تشخیص آنفلوانزا مورد توجه قرار گرفته و هماهنگی های لازم در خصوص اطلاع رسانی آن از طریق معاونت محترم درمان دانشگاه نیز به منظور پیشگیری از تاخیر در شروع درمان بیماران مورد اقدام قرار گیرد:

۱- داروی مذکور می تواند هم بعنوان مکمل پروفیلاکسی و هم درمان موارد مبتلا به آنفلوانزا بکار گرفته شود.

۲- گروه های دارای اولویت مصرف داروی فوق اشاره عبارتند از:

- a. بیماران قلبی یا ریوی شدید
- b. بیماران با نقص و یا کاهش ایمنی
- c. افراد با ریسک بالا که به هر دلیل واکسن آنفلوانزا را دریافت نکرده اند و هم اکنون دچار علائم بیماری می باشند و بروز بیماری در آنان با عوارض شدید همراه می باشد.
- d. افرادی که مراقبت از بیماران با ریسک بالا را برعهده دارند و واکسینه نشده اند و دچار علائم بیماری شده اند.

۳- مدت زمان استفاده از داروی اوسلتامیویر بعنوان پروفیلاکسی بمدت ۷-۱۰ روز (یک نوبت در روز) و بعنوان درمان بمدت ۵ روز (دو نوبت در روز) در افراد بزرگسال می باشد. مدت درمان بنا به تشخیص پزشک معالج می تواند بیشتر از مدت ذکر شده باشد. در کودکان بر اساس جداول دارویی و تعدیل دوز اقدام گردد.

۴- افراد در معرض تماس در کانون های آنفلوانزای پرندگان که واکسن آنفلوانزای سالمیانه دریافت نکرده اند به منظور پیشگیری پروفیلاکسی حداقل بمدت ۱۰ روز تحت درمان پروفیلاکسی با اوسلتامیویر قرار می گیرند.

a. افراد مشکوک به آنفلوانزای پرندگان بلافاصله باید تحت درمان با داروی فوق قرار گیرند.

شماره: ۳۰۴/۱۲۷۰۷

تاریخ: ۱۴۰۱/۰۷/۱۲

پیوست ندارد



جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی



تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین
مقام معظم رهبری

۵- پرسنل ارائه کننده خدمات بهداشتی درمانی در صورتی که اقدامات احتیاطی کنترل عفونت را بدرستی رعایت نکرده اند ضروری می باشد بعد از آخرین تماس با فرد بیمار، بمدت ۷-۱۰ روز تحت پروفیلاکسی دارویی با اوسلتامیویر قرار گیرند.

۶- گروههای پرخطر در بیماری آنفلوانزای پرندگان(افراد) که در تماس خانوادگی نزدیک و یا ساکنین یک خانه در تماس نزدیک با بیمار مشکوک یا تایید شده آنفلوانزای پرندگان ، محیط و پرندگان آلوده به آنفلوانزا می باشند)، بلافاصله در اولین فرصت باید داروی اوسلتامیویر را دریافت نمایند.

۷- گروههای با خطر متوسط و خطر کم در صورت نیاز و با نظر پزشک معالج ، درمان برای آنها شروع خواهد گردید(راهنمای کشوری مراقبت و کنترل بیماری آنفلوانزا- از انتشارات وزارت متبوع)

۸- افراد در معرض خطر و یا در معرض تماس بیماری آنفلوانزا در صورت بروز علائم باید بلافاصله با تشخیص پزشک معالج تحت درمان یا پروفیلاکسی دارویی با اوسلتامیویر قرار گیرند. این گروه شامل موارد زیر می باشد:

سالمدان، ساکنین آسایشگاهها و کارکنان آن، بیماران مبتلا به بیماریهای مزمن، بیماران مبتلا به بیماریهای مختل کننده سیستم تنفسی، خانم های باردار بلاخص در سه ماهه دوم و سوم بارداری، کودکان و نوجوانانی که تحت درمان طولانی مدت با ترکیبات سالیسیلات قرار دارند ، کارمندان مراکز ارائه کننده خدمات بهداشتی و درمانی، نیروهای درمانی ارائه کننده خدمات درمانی در منزل.

دکتر شهنام عرشی
سرپرست مرکز مدیریت
بیماریهای واگیر

