



و انجمن علمی پزشکی
و نهادهای علمی پژوهشی

لیست بیماری ها و سندروم های واگیر تحت مراقبت در جمهوری اسلامی ایران

SURVEILLANCE OF COMMUNICABLE DISEASES AND SYNDROMES IN I.R.A.N.

در صورت مشاهده هر یک از بیماری های واگیر یا سندرم های تحت مراقبت، به واحد پیدا شتی تعیین شده
(مرکز پیدا شت شهرستان / کارشناس کنترل عفونت بیمارستان) گزارش گردد.

جمهوری اسلامی ایران

دستبندی آنفلوانزا - معاونت پیدا شت
مکانیزم مدیریت بیماری های واگیر
اداره مراقبت

الف: لیست بیماری های عمدۀ تحت مراقبت

ROUTINE SURVEILLANCE

گزارش هفتگی (عمومی):

سایر انواع سل (بجز سل ریوی) - اتواع همایت های ویروسی - تیفوئید - بروسلوز - لیشمایزو جلدی (سالک) و لیشمایزو احشایی (کالا آزاد) - شبیگلوپس - سفلیس - سوزاک - HIV/AIDS - کیست هدایتیک - توکسوبالاسوسیس - فاسیولیازس - لیتوسیپریوزس - بدیکلوزس و گال

گزارش فوری (در کمتر از ۲۴ ساعت):

فلج شل حاد - تب و بثورات حاد جلدی ماکولوپایولر - سل ریوی - سیاه سرفه - دیفتری - کراز - سندرم سرخچه مادرزادی - منزیزت - مalaria - اسهال خونی - تب دنگی - تب راجعه - تب زرد - جذام - سیاه زخم جلدی - کراز بالغین - شیستوتزومیابیس پستری در بیمارستان بدنیاب و اکسیناسیون

گزارش آنی و بلافضله (کمتر از ۶ ساعت):
هاری - آنفلوانزا پرنده - تولارمی - طاعون - وبا - سیاه زخم تفسی - بوتولیسم - زیکا - چیکونگونیا - ایپولا - تب های خونریزی دهنده - کرونا - تیفوئید - مکانیزم به درمان - هرگونه افزایش ناگهانی موارد بیماریها (طغیان یا ایدمی)

ب- لیست سندرم های واگیر تحت مراقبت (مشمول گزارش فوری)

۳- سندرم تب و راش (بثورات) حاد جلدی:

FEVER AND ACUTE RASH SYNDROME

تعریف: تب بیش از ۳۸ درجه دهانی به همراه حداقل یکی از علائم زیر به صورت متناشر:

- لکه های کوچک و همسطح غیر همزنگ با پوست (ماکول) معمولاً به صورت متناشر
- دانه های کوچک و بر جسته غیر همزنگ با پوست (بابول) معمولاً به صورت متناشر

الف: تب و راش حاد ماکولوپایولر مهم ترین تشخیص های افتراقی: سرخک - سرخه - منگو کوکسی - منوکلوز عفونی - CCHF - چیکونگونیا - تب دنگی - سفلیس - تیفوس - تیفوئید - راش دارویی - گوش

هزار: تب بالاتر از ۳۸ درجه دهانی به همراه حداقل یکی از علائم زیر:

- دانه های کوچک، بر جسته و آبدار در پوست (وزیکول)
- بنرات گلیزی های بزرگ پوستی حاوی مایع غیر چربی (تاول) یا مایع چربی (بوستول)
- بنرات فاقد پوست (زمبهای بدون ضربه) یا بردگی

ب- تب و راش حاد غیر ماکولوپایولر: مهم ترین تشخیص های افتراقی: آبله - آبله مرغان - سیاه زخم - تولارمی - لیشمایزو جلدی (سالک) - گال

۲- سندرم تب و خونریزی (بدون تروما):

FEVER WITH HEMORRHAGIC MANIFESTATION SYNDROME

تعریف: تب بیش از ۳۸ درجه دهانی به همراه حداقل دو علامت از علائم زیر (خونریزی ناشی از تروما نباشد):

- خونریزی پوست به صورت کبودی (اکیموز)
- خونریزی نقطه تقطه قوه (پنشی) در پوست

الف: خونریزی دستگاه تنفس فوکانی (خونریزی از لته یا بینی)

ب- خونریزی دستگاه تنفس گوارش (استفراغ و مدفع خونی، مدفع سیاه)

ج- خونریزی دستگاه ادراری (ادرار خونی)

د- خونریزی دستگاه ادراری (ادرار خونی)

ه- خونریزی های افتراقی: CCHF

مهم ترین تشخیص های افتراقی: تب خونریزی دهنده کریمه کنگو - منگو کوکسی - تیفوئید

- تب دنگی - تب زرد - ایپولا - چیکونگونیا - سرخک - مalaria

- شدید - لیتوسیپریوز - سپتی سیمی

۱- سندرم فلچ شل حاد :

ACUTE FLACCID PARALYSIS SYNDROME

تعریف: فلچ شل ناگهانی یعنی عدم حرکت یا و یا است

بدون ساقیت تروما (فرموده) واضح جسمانی در سن زیر ۱۵ سال و

یا در هر سنتی به شرط مشکوک

شدن پزشک به قاج اطفال

مهم ترین تشخیص افتراقی: فلچ اطفال - گلین بار - آنسپلیت - میلیت عرضی

- آرتربیت - میوزیت - سینویوت

- ا نوع مسمومیت - گزش

- حیوانات و حشرات سمی -

- عوارض واکسیناسیون

۷- سندرم مسمومیت غذایی:

FOOD INTOXICATION SYNDROME

تعریف: بروز علائم زیر شامل بند ۱ یا ۲:

- تهوع و استفراغ بعد از مصرف مواد غذایی یا آشامیدنی
- شکم درد (دل پیچیده) بعد از مصرف مواد غذایی یا آشامیدنی

مهم ترین تشخیص های افتراقی: مسمومیت با عوامل باکتریایی، ویروسی، قارچی، انگلکی - مسمومیت با فلزات سنگین - مسمومیت با سموم - تب مالت - مسمومیت با الکل

۶- سندرم سرفه مزمن

CHRONIC COUGH SYNDROME

تعریف: سرفه پایدار به

مدت دو هفته یا بیشتر که معمولاً همراه با خلط می باشد.

مهم ترین تشخیص های افتراقی: افتراقی: سل

۱۲- سندرم تب طول کشیده

PROLONGED FEVER SYNDROME

تعریف: داشتن تب بیش از ۳۸ درجه دهانی به همراه سردرد خفیف، درد عضلات، کوفتگی بدن و حال عمومی بد.

مهم ترین تشخیص های افتراقی: سل - مalaria

- بروسلوز - تیفوئید - بروپلیز - لیتوسیپریوز -

- تب دنگی - لیشمایزو احشایی (کالا آزاد) - تب HIV/AIDS

۱۵- سندرم تب و تورم غدد لنفاوی

FEVER AND LYMPHADENOPATHY SYNDROME

تعریف: بروز تب به همراه تورم

حداد لنفاوی / گردن / زیر بغل /

کشله ران: (تب بیشتر از ۳۸ درجه دهانی به همراه حداقل یکی از علائم زیر):

از علائم زیر: بزرگی غدد لنفاوی / درد غدد لنفاوی / التهاب غدد

لنفاوی / افتراقی: افزایش مصرف الکل و مواد مخدوش

مهم ترین تشخیص های افتراقی: طاعون - تورم های غدد لنفاوی

۱۴- سندرم مرگ ناگهانی و غیرمنتظره (علائم عصبی)

SUDDEN DEATH AND UNEXPECTED SYNDROME

تعریف: مرگی که فاصله بین شروع علائم و وقوع مرگ کمتر از ۲۴ ساعت باشد و علت بیماریهای داخلی، تروما، قتل و موارد مشابه نباشد و علائم پوستی از قبیل بیشش، پورپورا، اکیموز، خونریزی در درد مشاهده می شود.

۱. توقف نیف و تنفس بعدی پیش از ۱۰ دقیقه در فاصله کمتر از ۲۴ ساعت از شروع علائم بیماری

۲. مرگ غیرمنتظره (مرگ ناگهانی که با دلایل مانند کهولت سین، بیماری مزمن و یا حادوت (تروماها) که مرگ را قابل توجیه می کند، ارتباط داشته باشد)

۳. فاصله بین شروع علائم و وقوع مرگ کمتر از ۲۴ ساعت

۴. مرگ از علت غدد لنفاوی / التهاب غدد

لنفاوی / افتراقی: افزایش مصرف الکل و مواد مخدوش

شدید - وبا - طاعون - مسمومیت های شیمیایی - سالمولوز - شیگلور - امیساز

- سایه زخم - اسفلات - سل - مالتوز - اسوان - دیگر و با

۱۶- سندرم بیماری های آمیزشی

SEXUALLY TRANSMITTED DISEASES SYNDROME

تعریف: وجود هر یک از علائم زیر:

* در نوزادان: ترشح چشمی * در خانم ها: درد زیر شکم - ترشح واژینال

* در آقایان: تورم بینه - ترشح مجرای زخم یا گل تناسلی - التهاب مقعد - تورم اینگوینال

مهم ترین تشخیص های افتراقی: سوزاک - سفلیس - زگل تناسلی - شانکر و پری

۵- سندرم عفونت شدید حاد تنفسی

SEVERE ACUTE RESPIRATORY INFECTIONS/ILLNESS SYNDROME

تعریف: بروز تب و سرفه در طولی که هفته اخیر بهمراه حداقل یکی از علائم زیر:

۱. در سیستم تنفسی (ناکره پنهان تند)، فرو رفتگی احتلالات بین دندنه ای در

حین تنفس، تنفس صدادار، خلط خونی)

۲. در سیستم عصبی (کاهش سطح هوشیاری، تشنج)

مهم ترین تشخیص های افتراقی: آنفلوانزا - سیاه

- آنفلوانزا - پارا آنفلوانزا - کرونا - سارس

- سرفه - کرونا - سارس

۴- سندرم شبیه آنفلوانزا (ILI)

INFLUENZA-LIKE ILLNESSES SYNDROME

تعریف: تب به همراه سرفه ای که در طی یک هفته اخیر رخ داده باشد.

۱. در سیستم تنفسی (ناکره پنهان تند)، فرو رفتگی احتلالات بین دندنه ای در

حین تنفس، تنفس صدادار، خلط خونی)

۲. در سیستم عصبی (کاهش سطح هوشیاری، تشنج)

مهم ترین تشخیص های افتراقی: آنفلوانزا - سیاه

- آنفلوانزا - پارا آنفلوانزا - سیاه

- سیاه

۹- سندرم اسهال خونی

BLOODY DIARRHEA SYNDROME

تعریف: اسهال خونی (غیرخونی)

خون روشن و قدرتی ۳ بار مذکو

استفراغ با شکم درد (دل پیچیده)

پیچیده) مالاریا شدید - لیتوسیپریوز

- بروپلیز - تب زرد - فاسیولیازس

- مسمومیت های شیمیایی - سالمولوز - قلزات سنگین -

- سایه زخم - اسوان - دیگر و با

۸- سندرم اسهال حاد غیرخونی

ACUTE DIARRHEA (NON-BLOODY) SYNDROME

تعریف: اسهال حاد (غیرخونی)

پیش از ۲۴ ساعت بعلو - یا بیش از ۲۴ ساعت

تقریباً ۳ بار مذکو

استفراغ با شکم درد (دل پیچیده)

مهم ترین تشخیص های افتراقی:

آسپاکلی - ناکره پنهانی از عوامل میکروبی،

بروپلیز - بارا یا گلین بار - وبا

- سارس - مalaria - سیاه زخم - اسهال خونی

- کرونا - سارس

۱۳- سندرم شوک عفونی

SEPTIC SHOCK SYNDROME

تعریف: بیمار بدحال با شوهد یک عفونت موضعی یا سیستمیک (به عنوان مثال رویت ترشح چربی،

با احتمال (استعداد) عفونت مثل نقص ایمنی، سوختگی... بعلو و احتمال حداقل ۲ علامت از ۳ علامت حیاتی ذیل:

۱. تاکی پنهان (تفصیل تندتر از حد نرمال)

۲. تاکی کاردی (ضریبان قلب بیشتر از حد نرمال)

۳. داشتن درجه حرارت کمتر از ۳۶ درجه سانتی گراد (هایپوترمی) یا داشتن تب بالای ۳۸ درجه

سانتیگراد (هایپر ترمی)

۴. مهم ترین تشخیص های افتراقی: منگو کوکسی - تیفوئید - بروپلیز - طاعون - آنفلوانزا - کرونا - سارس - مalaria - وبا - خشک - تب های خونریزی دهنده - سیاه زخم

علایم کمک: ۱. اختلال عملکرد ارگانهای دور از محل عفونت (بدلیل همیوپریفرین و بروز ایسکمی)

۲. افت شمار غدد لنفاوی که با تجویز مقدار کافی مایعات مناسب مثل نرمال سالنی، رینگر لاكتات قابل برگشت باشد.

۳. ایسکمی بروت: پرشدگی خون مویرگی بیشتر از ۳ ثانیه یا رنگ بریدگی بروت (در کودکان) (پس از بروز احتمال عفونت اندک شست از ریخت از ریخت اندک شست)

۴. اختلال عملکرد مغز: بیقراری، خواب آلودگی، کما (تغییر سطح هوشیاری)

۵. اختلال عملکرد مغز: تگکی نفس، کبودی مخاط ها و انتهایها

۶. اختلال عملکرد مغز: قاهری و در مراحل پیشرفتنه

۷. سردی انتهای اندامها (گاهی و در مراحل پیشرفتنه)