



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات
بهداشتی و درمانی قزوین

معاونت درمان

تاریخ: ۱۴۰۲/۰۷/۲۹

شماره: ۲۸/۳۶/۱۹۱۸۶۲

پیوست: دارد

۰۷:۴۵

رئیس محترم مرکز آموزشی درمانی بوعلی سینا، ولایت، قدس، کوثر، رجایی، ۲۲ بهمن

رئیس محترم بیمارستان رحیمیان، شفا

سرپرست محترم بیمارستان شهدا، امیرالمومنین (ع)

رئیس محترم بیمارستان تامین اجتماعی رازی، ناکستان

رئیس محترم بیمارستان خصوصی دهخدا، پاستور، مهرگان، ولیعصر آبیگ


رئیس محترم سازمان نظام پزشکی قزوین، البرز، ناکستان، آبیگ، بوئین زهرا

با سلام و احترام

به پیوست نامه شماره ۱۸۶۶۱/۴۰۰/د تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۴ معاون محترم درمان وزارت متبوع در خصوص ابلاغ راهنمای تجویز داروی ناتامایسین، جهت استحضار ارسال می‌گردد. ضمناً دستیابی به راهنمای مذکور از طریق پورتال معاونت درمان به آدرس ذیل امکان پذیر می‌باشد.

استانداردهای دارو / استانداردها و راهنماهای بالینی / دسترسی سریع / vct.qums.ac.ir

دکتر عبدالله کشاورز
معاون درمان دانشگاه



معاونت درمان

راهنمای تجویز داروی

NATAMYCIN

ناتامیسین

پاییز ۱۴۰۲

تنظیم و تدوین اولیه:

دکتر جباروند رییس انجمن چشم پزشکی ایران

دکتر صدوقی دبیر بورد رشته تخصصی چشم پزشکی

دکتر احمدیه فلوشیپ و پتره ورتین استاد علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتر فکری فلوشیپ و پتره ورتین

دکتر سلام زاده رییس انجمن علمی متخصصین داروسازان بالینی

دکتر علیمردانی متخصص فارماکوتراپی

دکتر ضیایی متخصص فارماکوتراپی

دکتر ذوقی متخصص فارماکوتراپی

دکتر گودرزی داروساز عمومی

با همکاری:

دفتر نظارت و پایش مصرف فراورده های سلامت سازمان غذا و دارو

مشاور: دکتر ساناز بخشنده رییس گروه تدوین استاندارد و راهنمای بالینی معاونت درمان

تحت نظارت فنی:

گروه تدوین استاندارد و راهنماهای سلامت

دفتر ارزیابی فن آوری، تدوین استاندارد و تعرفه سلامت

بسمه تعالی
راهنمای تجویز دارو

نام دارو	افراد صاحب صلاحیت تجویز	شرط تجویز		محل تجویز و کاربرد دارو	دوز و تواتر مصرف دارو	شرایط تجویز
		اندیکاسیون	کنترا اندیکاسیون			
Natamycin 5% (ophthalmic suspension)	متخصص چشم پزشکی	(۱) کراتیت قارچی (۲) بلفاریت یا کونژوکتیویت قارچی	حساسیت به دارو یا هر کدام از اجزاء فرمولاسیون احتیاط استفاده در بارداری، شیردهی و کودکان	سرپایی بستری	کراتیت قارچی: یک قطره هر ۱ تا ۲ ساعت در چشم برای ۳ تا ۴ روز، سپس ۶ تا ۸ بار در روز (هر ۳ تا ۴ ساعت). در صورت پاسخ بالینی مناسب طول دوره درمان معمولاً ۲ تا ۳ هفته و یا تا زمان بهبود کراتیت قارچی فعال است (کاهش تدریجی دوز دارو در دوره‌های ۴ تا ۷ روزه جهت اطمینان از پاکسازی میکروارگانیسم سودمند است). بلفاریت یا کونژوکتیویت قارچی: یک قطره در چشم هر ۴ تا ۶ ساعت.	صرفاً جهت استفاده موضعی چشمی. پیش از مصرف به خوبی تکان داده شود. قبل و بعد از استفاده دست‌ها شسته شوند. احتیاط کنید تا نوک قطره با چشم یا سایر سطوح تماس پیدا نکند. -در طول درمان استفاده از لنز تماسی ممنوع می‌باشد.

- اقدامات مورد نیاز قبل از تجویز دارو (اقدامات پاراکلینیک و ...)
- تجویز دارو ، بر اساس نمونه گیری از سطح چشم یا تایید تشخیص عفونت قارچی یا اسکن کانفوکال، بر حسب نظر پزشک معالج (متخصص چشم پزشکی) می باشد.

- **توصیه ها :**

چشمی: فقط برای استفاده موضعی چشمی. قبل از استفاده خوب تکان دهید. قبل و بعد از استفاده دست ها را بشویید.

- **منابع:**

- Mahmoudi S, Masoomi A, Ahmadikia K, Tabatabaei SA, Soleimani M, Rezaie S, Ghahvechian H, Banafsheafshan A. Fungal keratitis: An overview of clinical and laboratory aspects. Mycoses. 2018 Dec;61(12):916-930
- Up to Date