



تاریخ : ۱۴۰۳/۰۴/۱۷

شماره : ۲۸/۳۶/۲۰۱۳۱۱

پیوست: ندارد

۱۰:۱۷

رئیس محترم مرکز آموزشی درمانی بوعلی سینا، ولایت، قدس، کوثر، شهید رجایی، ۲۲ بهمن

رئیس محترم بیمارستان رحیمیان، شهدا، شفا، امیرالمؤمنین (ع)

رئیس محترم بیمارستان تامین اجتماعی رازی، تاکستان

رئیس محترم بیمارستان خصوصی دهدخدا، پاستور، مهرگان، ولیعصر (ع)

رئیس محترم سازمان نظام پزشکی قزوین، البرز، تاکستان، آبیک، بوئین زهرا

#### با سلام و احترام

عطاف به نامه شماره ۱۴۰۳/۰۴/۱۳۶۶ د تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۷۹۶۶ معاون محترم درمان وزارت متبع در خصوص نشر و اجرای راهنمای طبابت بالینی مبنی بر شواهد با موضوع ابلاغ "شناسنامه و استاندارد خدمت آنتیوگرافی عروق کرونر به همراه هر تعداد تزریق اضافی در حفرات قلب یا ریشه آئورت به همراه خواندن فیلم و گزارش نهایی"، به استحضار می‌رساند راهنمای مذکور در آدرس ذیل قابل دسترسی است، لذا در راستای بهره‌مندی و اقدام بر اساس راهنمای ابلاغی، خواهشمند است دستور فرمائید به آدرس ذیل مراجعه نمایند.

استانداردهای قلب و عروق • استانداردها و راهنمایی‌های بالینی • دسترسی سریع <http://vct.qums.ac.ir>

دکتر صیغله کشاورز  
معاون درمان دانشگاه

رونوشت :

۱. مدیر کل محترم بیمه سلامت استان، جهت استحضار
۲. سرپرست محترم مدیریت درمان تامین اجتماعی استان، جهت استحضار
۳. مدیر کل محترم تامین اجتماعی نیروهای مسلح استان، جهت استحضار

شماره ..... ۷۹۶۶/۰۰۴  
تاریخ ..... ۱۳/۰۴/۱۴  
پرست ..... دارد

بسمه تعالیٰ

جمهوری اسلامی ایران  
وزارت بهداشت، دیوان امور پزشکی  
معاونت درمان

رسای محتشم کلیه دانشگاهها / دانشکده های علوم پزشکی کشور

جناب آقای دکتر میرهاشم موسوی

مدیرعامل محترم سازمان تامین اجتماعی

جناب آقای دکتر محمد مهدی ناصحی

مدیرعامل محترم سازمان بیمه سلامت

جناب آقای دکتر محمد رئیس زاده

رئیس کل محترم سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

جناب آقای دکتر عباس مسجدی آرانی

رئیس محترم سازمان پزشکی قانونی کشور

جناب آقای دکتر حمیدرضا امیر احمدی

مدیرعامل محترم سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح

جناب آقای دکتر سید حیدر محمدی

معاون محترم وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو

**موضوع:** ابلاغ شناسنامه و استاندارد خدمت آنژیوگرافی عروق کرونر به همراه هر تعداد تزریق اضافی در

حفرات قلب یا ریشه آئورت به همراه خواندن فیلم و گزارش نهائی

### با سلام و احترام:

همانگونه که مطلع می باشید یکی از راهکارهایی که برای پیشگیری از افزایش هزینه‌های درمان و تحمیل بار اقتصادی سنگین به نظام سلامت و جامعه در کشورهای مختلف مورد توجه است تدوین و نشر راهنمایی‌های بالینی مبتنی بر شواهد است که به عنوان یکی از محورهای برنامه جامع عدالت، تعالی و بهره وری در آموزش علوم پزشکی نیز مورد توجه می باشد. در همین راستا معاونت درمان تدوین مصروفات دانشی را (راهنمایی بالینی، استاندارد، پروتکل و ...) با اولویت خدمات پرتواتر، دارای پوشش بیمه ای، هزینه (خدمات، تجهیزات) با حضور جمعی از اساتید حوزه های مختلف، در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل و سیاستگذاری و برنامه ریزی این امر را عهده دار شده است. لذا در راستای پویا سازی ارائه خدمات پزشکی و اجرایی نمودن بر مبنای بند ۵ و ۱-۸ سیاستهای کلی سلامت



جمهوری اسلامی ایران

وزارت بهداشت، دیوان امور پسندیدگی

معاونت درمان

بسمه تعالیٰ

شماره ..... ۵۴۰۰/۷۹۶۶  
تاریخ ..... ۱۴۰۳/۰۴/۱۳  
پوست ..... دارد

و ماده ۷۴ قانون برنامه ششم توسعه کشور ، مبنی بر اجازه تجویز خدمات و انجام خرید راهبردی سازمان های بیمه گر بر اساس دستورالعمل ها و راهنمایی بالینی توسط وزارت بهداشت و بر اساس دستورالعمل اجرایی کد تعديلی ۶۰ به شماره ۲۳۳۱۲/۴۰۰ مورخ ۰۹/۰۹/۱۴۰۱ «شناسنامه و استاندارد خدمت آنژیوگرافی عروق کرونر به همراه هر تعداد تزریق اضافی در حفرات قلب یا ریشه آئورت به همراه خواندن فیلم و گزارش نهائی » به تصویب رسیده و از تاریخ ابلاغ لازم اجرا است.

بدیهی است ضمن تأکید بر ارائه خدمت در چارچوب استانداردهای مورد تائید وزارت متبع، اعلام می گردد دانشگاه/دانشکده، انجمن ها و سازمان نظام پزشکی مبایست از این محصولات در آموزش های بازآموزی استفاده و سازمان های بیمه گر نیز بر اساس محصولات دانشی اقدام به خرید راهبردی نمایند. امید است با بهره مندی از تلاش جمعی و اطلاع رسانی در این زمینه، شاهد تحولی جدی در حوزه استقرار و بکارگیری راهنمایها به منظور ارتقای کیفیت خدمات و کاهش هزینه های غیر ضروری باشیم.

لازم به ذکر است شناسنامه و استاندارد خدمت مذکور از طریق تارنمای معاونت درمان به آدرس

<http://medcare.behdasht.gov.ir> در دسترس می باشد.

دکتر سعید گریمی  
معاون درمان

ଓ

جمهوری تکان  
وزارت بهداشت، دیانت آموزش

معاونت درمان

بسمه تعالیٰ

شماره ..... ۵۴۰۰/۷۹۶۶  
تاریخ ..... ۱۴۰۳/۰۴/۱۳  
پیوست ..... دارد



معاونت درمان

دبيرخانه شورای راهبردي تدوين راهنمahu سلامت

شناسame و استاندارد خدمت

سى تى آنثروگرافى عروق کرونر

پايز ۱۳۹۸

**تنظیم و تدوین:**

دکتر فریدون نوحی دبیر بورد تخصصی رشته قلب و عروق و رئیس انجمن قلب و عروق ایران  
دکتر سیف الله عبدی متخصص قلب و عروق، فلوشیپ اقدامات مداخله ایی قلب و عروق  
دکتر مرضیه متولی عضو هیئت علمی مرکز قلب و عروق شهید رجایی  
دکتر حمیدرضا پورعلی اکبر عضو هیئت علمی مرکز قلب و عروق شهید رجایی  
دکتر کیارا رضایی کلانتری عضو هیئت علمی مرکز قلب و عروق شهید رجایی  
دکتر سا ناز اسدیان عضو هیئت علمی مرکز قلب و عروق شهید رجایی

**تحت نظارت فنی:**

گروه استانداردسازی و تدوین راهنمایی سلامت  
دفتر ارزیابی فن آوری، استانداردسازی و تعریف سلامت

دکتر بهزاد کلانتری، فرانک ندرخانی،  
دکتر مریم خیری، آزاده حقیقی

## الف) عنوان دقیق خدمت مورد بررسی (فارسی و لاتین) به همراه کد ملی:

Coronary CT Angiography

سی تی آنژیوگرافی مالتی دتکتور ۶۴ اسلایس یا بیشتر عروق کرونر قلب

کد ملی: ۷۰۲۴۸۵

## ب) تعریف و تشریح خدمت مورد بررسی :

روش غیر تهاجمی تصویربرداری عروق کرونر قلب است. در این روش با کانولارسیون وریدی که غالباً از دست راست با آنژیوکت انجام می شود تزریق ماده حاصل یدار با انشکتور دوال انجام شده و با استفاده از دستگاه سی تی اسکن مولتی دتکتور با تعداد ردیف دتکتور ۶۴ یا بیشتر (۳۸۴-۲۵۶) تصویربرداری سریع از عروق کرونر قلب ضمن کنترل ضربان قلب با کاهش تعداد ضربان قلب به حدود ۶۰ ضربه در دقیقه و تهیه تصاویر با کنترل ECG انجام می گردد. (۱)

## ت) موارد ضروری انجام مداخله تشخیصی (اندیکاسیون)

### acute coronary syndrome

- بیماران مشکوک به سندروم حاد کرونر
  - در صورتی که ECG نرمال و بیومارکر نرمال دارند یا ECG غیر قابل قضاوت و بیو مارکر غیر قابل قضاوت دارند.
  - در صورتی که intermediate pre test probability, low pre test probability باشند اندیکاسیون انجام دارد.
  - در بیماران CABG در صورتی که بیمار علامت دار شود یعنی علائم ایسکمیک نشان دهنده.
  - بعد از Stent با دیامتر استنت بیش از ۳ میلی متر
  - اگر بیمار Stent در سایر عروق کرونر دارد و زمان آن بیش از ۲ سال است و دیامتر استنت بالاتر از 3mm است ممکن است در شرایطی که کلینیسین تشخیص دهد مناسب باشد.
  - انجام سی تی آنژیوگرافی برای بیمارانی که سایر تست های تشخیصی را انجام داده اند در موارد ذیل پیشنهاد می شود:
    - Stress Imaging
    - مشاهده تشدید علائم بیمار در صورتی که تست های قبلی با استرس نرمال بوده است.
    - انجام کلسیم اسکور و مشاهده اسکور کمتر از 400 HU
    - تست ورزش با کنترل ECG و مشاهده بیمار با intermediate risk
  - علائم بیمار حاد نیست ولی احتمال ایسکمی میزود و بیمار بر اساس pre stent probability of CAD intermediate risk score است.
  - برای بیماران بدون علامت: ابتدا کلسیم اسکور انجام شود. اگر بیمار intermediate risk for CAD باشد و یا low risk باشد با سابقه فامیلی مثبت
  - در بیماری که نارسایی قلبی او تازه آغاز شده و با کاهش بازده قلب مراجعه کرده، در صورت / low risk score intermediate risk score مناسب است
  - برای بیمارانی که جراحی قلب غیر کرونری انجام داده اند در صورت / intermediate risk probability مناسب است

## ج) تواتر ارائه خدمت:

برای انجام سی تی آنژیوگرافی عروق کرونر تواتر خاصی ذکر نشده است. لذا در صورت بروز علائم بالینی مرتبط در قسمت اندیکاسیون ها قابل تکرار می باشد.

## د) افراد صاحب صلاحیت جهت تجویز (Order) خدمت مربوطه و استاندارد تجویز:

- متخصص قلب و عروق و کلیه فوق تخصص ها و فلوشیپ های مرتبط
- فوق تخصص جراحی قلب
- فوق تخصص قلب کودکان
- فوق تخصص جراحی قلب اطفال
- متخصص داخلی
- متخصص طب اورژانس (در موقع بستری و اورژانس)

## ه) ارائه کننده اصلی صاحب صلاحیت جهت ارائه خدمت مربوطه:

متخصص رادیولوژی

## و) عنوان و سطح تخصص های مورد نیاز (استاندارد) برای سایر اعضای تیم ارائه کننده خدمت:

ردیف	عنوان تخصص	تعداد مورد نیاز به طور استاندارد به ازای ارائه هر خدمت	میزان تحصیلات مورد نیاز	سابقه کار و یا دوره آموزشی مصوب در صورت لزوم	نقش در فرآیند ارائه خدمت
۱	کارشناس رادیولوژی	دو نفر	لیسانس و بالاتر	حداقل یکسال سابقه کار با دستگاه سی تی مولتی اسلاسیس یا گذراندن دوره اختصاصی برای انجام سی تی آنژیوگرافی	انجام سی تی اسکن
۲	پرستار / بهیار یا تکنسین بیهوشی	یک نفر	فوق دیپلم و یا بالاتر		گرفتن IV ، مراقبت حین تزریق دارو و عوارض مربوط به آن و احیائی قلبی و عروقی
۳	منشی	یک نفر	لیسانس و یا بالاتر		

## ز) استانداردهای فضای فیزیکی و مکان ارائه خدمت:

بر طبق مقررات و استانداردهای سازمان انرژی اتمی و همچنین اداره صدور پروانه تاسیس و بهره برداری مراکز تصویربرداری وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی

## ح) تجهیزات پزشکی سرمایه‌ای به ازای هر خدمت:

- دستگاه سی تی اسکن سریع با سرعت چرخش گانتری ms 350 یا کمتر
- حداقل تعداد ردیف دتکتور 64 (1 x 64 یا 2 x 32) و یا دستگاههای جدیدتر با عرض دتکتورهای 0.625 mm یا کمتر
- انژکتور دوال (Dual injector) که پروتکل تزریق دوفاز یا سه فاز با سرعت تزریق بالا (4-7 cc/sec) دارد (۱)
- تبصره: چنانچه انژکتور دوال در دسترس نبود یا امکان تهیه آن نباشد با single head injector نیز قابل انجام است
- پریتر جهت چاپ گرافی
- PACS سیستم
- ونتیلاتور
- ترالی اورژانس
- مونیتور عالیم حیاتی
- دستگاه اندازه گیری فشار خون
- گرم کننده دارو
- یخچال جهت نگهداری دارو

## ط) داروهای مواد و لوازم مصرفی پزشکی ارائه هر خدمت:

ردیف	اقلام مصرفی مورد نیاز	میزان مصرف (تعداد یا نسبت)
۱	آنژیوکت	یک عدد سایز ۱۸ یا ۲۰ در فرد بالغ و سایز ۲۲ در اطفال
۲	داروی حاجب یددار	270-400 mg/cc با سرعت تزریق 5-7 cc/sec و مدت زمان تزریق حداقل ۱۰ ثانیه و حجم ماده حاجب به میزان 1 cc/kg در بالغین و در اطفال به مقدار 1-2 cc/kg
۳	بتابلوکر	متوبرولول ۱۰۰-۵۰ میلی گرم ۱۲ ساعت و یک ساعت قبل از اسکن تا رسیدن به ضربان کمتر از یا مساوی 60 bpm اتنولول برای بیماران نارسایی کبدی به عنوان بتابلوکر اگر ضربان قلب به حد مطلوب نرسید بتابلوکر وریدی ۵ میلی گرم هر ۵ دقیقه با کترول ضربان قلب تا حداقل 20-25 mg
۴	نیتروگلیسیرین	400-800 mg نیتروگلیسیرین زیر زبانی به صورت قرص یا اسپری (یک یا دو قرص یا یک یا دو پاف اسپری) ۵ دقیقه قبل از اسکن
۵	لوله های connector	یک عدد
۶	نرمال سالین	تزریق ۴۰-۵۰ میلی لیتر سالین با سرعت تزریق 5-7 cc/sec 5 تزریق سالین با انژکتور dual پروتکل biphasic است که بلا فاصله بعد از تزریق ماده حاجب تزریق آغاز میشود و هدف آن پاک کردن قلب راست از ماده حاجب به منظور از بین رفتن آرتیفیکت ماده حاجب است
۷	ECG leads	لید ECG بر روی قفسه سینه در جداره قدامی متصل می شود. قبل و کل مراحل تصویربرداری کرونر باید تصاویر ECG قابل مشاهده باشد. (ECG gated)

## ظ) اقدامات پاراکلینیکی، تصویربرداری یا دارویی مورد نیاز قبل از ارائه خدمت:

اندازه گیری BUN & CREATININ

۱. تجویز متورپرولول ۵۰-۱۰۰ میلی گرم ۱۲ ساعت و یک ساعت قبل از اسکن تا رسیدن به ضربان کمتر یا مساوی 60 bpm ۲. تجویز آتنولول برای بیماران نارسایی کبدی به عنوان بتابلوکر ۳. اگر ضربان قلب به حد مطلوب نرسید بتابلوکر وریدی 5 mg هر ۵ دقیقه با کنترل ضربان قلب تا حداقل 20-25 mg استفاده میشود	تجویز بتابلوکر غیر از موارد کنترالندیکاسیون
تجویز 400-800 mg نیتروگلیسیرین زیر زبانی به صورت قرص یا اسپری (یک یا دو قرص یا یک یا دو پاف اسپری) ۵ دقیقه قبل از اسکن	تجویز نیتروگلیسیرین غیر از موارد کنترالندیکاسیون

## ی) استانداردهای گزارش:

اجزاء گزارش دهی در سی تی آنژیوگرافی عروق کرونر

- اطلاعات کلینیکی: اندیکاسیون ، اطلاعات دموگرافیک بیمار شامل نام ، سن ، جنس و پژوهش ارجاع کننده ، قد ، وزن ، BMI و تاریخچه بیمار شامل علائم ، ریسک فاکتورها و تستهای تشخیصی مربوطه
- اطلاعات مربوط به پروسیجر: نوع تست (یعنی سی تی آنژیوگرافی- کلسیم اسکور- فونکسیون بطن ، وریدهای پولمونر ، آنورت و ....)
- تجهیزات به کار رفته یعنی نوع دستگاه سی تی اسکن شامل تعداد ردیف دکتورها ، تعداد منبع تولید اشعه X و پوشش Z-axis
- اسکن مد ، ECG- synchronization ، مشخصات تیوپ
- نوع بازسازی ، ضخامت اسلامیس
- نوع و دوز داروی استفاده شده جهت کنترل ضربان قلب شامل بتابلوکر ، نیتروگلیسیرین و نوع ماده حاجب مورد استفاده و دوز مصرف شده و سرعت تزریق کنتراست
- عوارض احتمالی ایجاد شده برای بیمار
- تعداد ضربان قلب و ریتم قلبی شامل ریتم سینوسی یا آریتمی
- گزارش اصلی شامل: کلسیم اسکور ، آنatomی عروق کرونر ، رگ کرونر غالب (coronary dominance) آنومالی کرونر (در منشاء یا مسیر و آنومالی بدحیم عروق کرونر) دیلاتاسیون و آنوریسم ، واریانتهای آنatomیک (خوش خیم) و myocardial bridging
- تنگی عروق کرونر و شدت آن
- تعیین نوع پلاک کلسیفیه و یا غیر کلسیفیه و حضور remodeling و plaque burden
- وسعت تنگی عروق کرونر شامل طول ضایعه ، درگیری استیوم یا محل شاخه شدن ، حضور tortuosity یا remodeling
- استفاده از SCCT classification برای بررسی شدت درگیری عروق کرونر
- استنت عروق کرونر : مشاهده مکان استنت ، قابل تفسیر بودن و باز بودن استنت

- گرافت عروق کرونر : نوع ، مکان ، مسیر ، قابل تفسیر بودن ، باز بودن ، تنگی و یا انسداد گرفت
- یافته های غیر کرونر شامل عروق بزرگ ، حفرات قلب ، میوکاردیوم ، پریکاردیوم ، دریچه ، حضور (pace maker-ICD) device و یافته های غیر قلبی شامل ریه ، مدیاستن ، مری ، قفسه سینه ، استخوانهای ، دیواره قفسه سینه و بخش فوقانی شکم و کبد و هر آنچه که در فیلد تصویربرداری قابل مشاهده است باید مد نظر و مورد گزارش باشد. (۲)

### گ) شواهد علمی در خصوص کنتراندیسکاسیون های خدمت:

کنتراندیسکاسیون این روش شامل موارد زیر است:

- سابقه واکنش آنافیلاکتوئید به ماده حاجب که کنتراندیسکاسیون مطلق است.
- کنتراندیسکاسیون نسبی شامل موارد ذیل است:
  - عدم همکاری بیمار در طی انجام اسکن و یا نگهداری تنفس در حین انجام تصویربرداری قلب
  - حاملگی
  - عدم ثبات کلینیکی (برای مثال: انفارکتوس حاد میوکارد، نارسایی قلب با تشدید ناگهانی علائم یعنی decompensate HF، فشار خون بسیار پایین)
  - نارسایی کلیوی (۱)

### ل) مدت زمان ارائه هر واحد خدمت:

از شروع آماده سازی تا پایان خدمت حدود ۳۰ دقیقه

### ف) موارد ضروری جهت آموزش به بیمار

- قبل از انجام اسکن باید فرمی در اختیار بیمار قرار گیرد که در آن موارد ذیل قید گردیده باشد:
- مشخصات بیمار ، قد ، وزن ، سن ، جنس
  - حاملگی : هر بیماری که در سنین حاملگی است باید این مورد را تعیین نماید
  - سابقه واکنش به تزریق داروی حاجب و عوارض احتمالی و همچنین کنتراندیسکاسیون برای مصرف بتاپلوكر و نیتروگلیسیرین
  - سابقه نارسایی کلیوی
  - هرگونه سابقه حساسیت به مواد آلرژن
  - سابقه برونکواسپاسم ، هیپرتروفیک کاردیومیوپاتی ، تنگی شدید دریچه آئورت
  - درمان با داروهایی همانند metformin, sildenafil, vardenafil, Tadalafil
  - هرگونه سابقه مدبکال که بیمار دارد
  - ناشتا بودن بیمار ۳ تا ۴ ساعت قبل از انجام تصویربرداری قلب و عروق

- مصرف آب و مایعات بدون کافئین تا زمان انجام سی تی کرونر توصیه میشود (جهت پیشگیری از اختلال عملکرد کلیه ، رگ گیری خوب و ممانعت از هیپوتانسیون بعد از انجام سی تی آنژیوگرافی کرونر)
- از ۱۲ ساعت قبل از انجام باید کافئین قطع گردد شامل قهوه ، چایی ، نوشیدنیهای انرژی زا ، قرص های انرژی زا ، قرصهای رژیم و سودا
- داروهایی که از قبل بیمار استفاده میکرده است (به غیر از موارد کتراندیکاسیون) باید مصرف گردد
- در صورت سابقه آرژی بیمار تحت نظر پزشک معالج باید پردنیزون خوراکی به صورت قرص ۵۰ میلی گرمی ۱۳، ۷، ۱ میلی گرمی ساعت قبل از مصرف داروی حاجب استفاده نماید. یک دوز دیفن هیدرامین ۵۰ میلی گرم یک ساعت قبل از مصرف داروی حاجب
- متفورمین از ۴۸ ساعت قبل از مصرف کتراست قطع گردد
- در اطفال ممکن است نیاز به بیهوشی باشد. در ضمن تمام قوانین فوق در مورد اطفال نیز صادق است (۱)

#### منابع:

1. SCCT guidelines for the performance and acquisition of coronary computed tomographic angiography: A report of the society of cardiovascular computed tomography guidelines committee: Endorsed by the north American society for cardiovascular imaging (NA SCI)- october-2016 journal of cardiovascular CT: Shuuny Abbara et.al
2. SCCT guidelines for the interpretation and reporting of coronary CT angiography: A report of the society of cardiovascular computed tomography Guidelines committee 2014, Jonathon Leipsic et.al
3. ACC F/ SCCT/ACR/ AHA / ASE / ASNC/ NASCI / SCMR 2010 appropriate use criteria for cardiac CT: A report of American collage of cardiology foundation appropriate use criteria task force, the SCCT, the American collage of radiology, AHA, AS of echocardiography , AS of nuclear cardiology, north American society of cardiovascular imaging, society of cardiovascular angiography and intervention and SCMR  
Allen J. Tayio et.al
4. Journal of American college of radiology volume 57, issue 6, 8 February 2011-page 758-759

- تاریخ اعتبار این راهنمای ابلاغ به مدت ۲ سال می باشد و بعد از اتمام مهلت زمانی مبایست ویرایش صورت پذیرد.

گزارشات ثبت	مدت زمان ارائه	توافر خدمتی		محل ارائه خدمت	شرط تجویز		ارائه کنندگان اصلی صاحب صلاحیت	افراد صاحب صلاحیت تجویز	کاربرد خدمت	RVU کد	عنوان استاندارد	
		تعداد دفعات مورد نیاز	فواصل انجام		کنترل اندیکاسیون	اندیکاسیون						
اطلاعات کلینیکی: اندیکاسیون، اطلاعات دموگرافیک بیمار شامل نام، سن، جنس و پزشک ارجاع کننده، قد، وزن، BMI و تاریخچه بیمار شامل علائم، ریسک فاكتورها و تستهای تشخیصی مربوطه اطلاعات مربوط به پرسیж: نوع تست (یعنی سی تی آنژیوگرافی - کلسیم اسکور - فونکسیون بطن، وریدهای پولمونر، آئورت و ....) تجهیزات به کار رفته یعنی نوع دستگاه سی تی اسکن شامل تعداد ردیف دتکتورها، تعداد منبع تولید اشعه X و پوشش Z-axis synchronization ECG- synchronization	۳۰ دقیقه			سابقه واکنش آنافیلاکتوئید به ماده حاجب که کنترل اندیکاسیون مطلق است کنترل اندیکاسیون نسبی شامل موارد ذیل است:	بیماران مشکوک به سندروم حاد کرونری acute coronary syndrome در صورتی که ECG نرمال و بیومارکر نرمال دارند یا ECG غیر قابل قضاؤت و بیومارکر غیر قابل قضاؤت دارند در صورتی که intermediate pretest probability, low pretest probability باشند اندیکاسیون انجام دارد.	در بیماران CABG در صورتی که بیمار علامت دار شود یعنی علائم ایسکمیک نشان دهنده.	- متخصص قلب و کلیه فوق تخصص ها و فلوشیپ های مرتبط	- فوچ	متخصص جراحی قلب	متخصص قلب کودکان رادیولوژی	متخصص اطفال	سی تی آنژیوگرافی مالتی دتکتور ۶۴ اسلاسیس یا بیشتر عروق کرونر قلب
اسکن مد، ECG- synchronization			برای انجام سی تی آنژیوگرافی عروق کرونر توافر خاصی ذکر نشده	بیمارستان	عدم همکاری بیمار در طی انجام دهنده.	بعد از Stent در main left با دیامتر استنت بیش از ۳ میلی متر اگر بیمار Stent در سایر عروق کرونر دارد و زمان آن بیش از ۲ سال است و دیامتر استنت بالاتر از 3mm است ممکن است در شرایطی که کلینیسین تشخیص دهد مناسب باشد.	استنت بیش از ۳ میلی متر اگر بیمار Stent در سایر عروق کرونر دارد و زمان آن بیش از ۲ سال است و دیامتر استنت بالاتر از 3mm است ممکن است در شرایطی که کلینیسین تشخیص دهد مناسب باشد.	متخصص اطفال	متخصص اطفال	متخصص اطفال	متخصص اطفال	متخصص اطفال
تیپ نوع بازسازی ، ضخامت اسلاسیس نوع و دوز داروی استفاده شده جهت کنترل ضربان قلب شامل بتابلوکر، نیتروگلیسیرین و نوع ماده حاجب مورد استفاده و دوز مصرف شده و سرعت تزریق کنترast عوارض احتمالی ایجاد شده برای بیمار تعداد ضربان قلب و ریتم قلبی شامل ریتم سینوسی یا آریتمی گزارش اصلی شامل : کلسیم اسکور، آناتومی عروق کرونر، رگ کرونر غالب (coronary dominance) آنومالی کرونر (در منشاء یا مسیر و آنومالی بدخیم عروق کرونر) دیلاتاسیون و آنوریسم، واریانتهای آناتومیک (خوش خیم) و myocardial bridging			تصویربرداری قلب حاملگی عدم ثبات کلینیکی (برای مثال انجام سی تی آنژیوگرافی برای بیمارانی که سایر تست های تشخیصی را انجام داده اند در موارد ذیل پیشنهاد می شود: ناگهانی علائم یعنی decompensate HF، فشار خون بسیار پایین) نارسایی کلیوی	افشارکتوس حاد میوکارد، نارسایی قلب با تشديد نارسایی Stress imaging خفیف بوده است مشاهده تشدید علائم بیمار در صورتی که تست های قبلی با استرس نرمال بوده است.	مشاهده تشدید علائم بیمار در صورتی که تست های قبلی با استرس نرمال بوده است.	طب اورژانس (در موقع)	متخصص اورژانس	متخصص اورژانس	متخصص اورژانس	متخصص اورژانس	متخصص اورژانس	
						انجام کلسیم اسکور و مشاهده اسکور						

<p>تنگی عروق کرونر و شدت آن</p> <p>تعیین نوع پلاک کلسفیه و یا غیر کلسفیه و حضور plaque burden و remodeling</p> <p>و سعت تنگی عروق کرونر شامل طول ضایعه ، درگیری استیم یا محل شاخه شدن ، حضور Positive remodeling یا tortuousity</p> <p>استفاده از SCCT classification برای بررسی شدت درگیری عروق کرونر</p> <p>استنت عروق کرونر : مشاهده مکان استنت، قابل تفسیر بودن و باز بودن استنت</p> <p>گرافت عروق کرونر : نوع، مکان، مسیر، قابل تفسیر بودن، باز بودن، تنگی و یا انسداد گرافت یافته های غیر کرونر شامل عروق بزرگ، حفرات قلب، میوکاردیوم، پریکاردیوم، دریچه، حضور ( pace maker-ICD) device و یافته های غیر قلبی شامل ریه، مدیاستان، مری، قفسه سینه، استخوانهای، دیواره قفسه سینه و بخش فوقانی شکم و کبد و هر آنچه که در فیلد تصویربرداری قابل مشاهده است باید مد نظر و مورد گزارش باشد. (۲)</p>			(۱)	<p>کمتر از 400 HU</p> <p> تست ورزش با کنترل ECG و مشاهده بیمار با intermediate risk</p> <p> علائم بیمار حاد نیست ولی احتمال ایسکمی میرود و بیمار بر اساس pre stent intermediate probability of CAD risk score است.</p> <p> برای بیماران بدون علامت : ابتدا کلسیم intermediate اسکور انجام شود. اگر بیمار risk for CAD باشد و یا low باشد باسابقه فامیلی مثبت سایر موارد :</p> <p> در بیماری که نارسایی قلبی او تازه آغاز شده و با کاهش بازده قلب مراجعه کرده، در صورت low risk score / intermediate risk score مناسب است</p> <p> برای بیمارانی که جراحی قلب غیر کرونری انجام داده اند در صورت intermediate risk probability (۳)</p>	اورژانس)	
--	--	--	-----	---	----------	--

• تاریخ اعتبار این راهنمای زمان ابلاغ به مدت ۲ سال می باشد و بعد از اتمام مهلت زمانی مبایست ویرایش صورت پذیرد.