



تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۱۶

شماره: ۲۸/۳۶/۲۰۲۳۹۸

پیوست: ندارد

۱۲:۰۵

رییس محترم مرکز آموزشی درمانی بوعلی سینا، ولایت، قدس، کوثر، شهید رجایی، ۲۲ بهمن
رییس محترم بیمارستان رحیمیان، شهدا، شفا، امیرالمومنین (ع)
رییس محترم بیمارستان تامین اجتماعی رازی، تاکستان
رییس محترم بیمارستان خصوصی دهخدا، پاستور، مهرگان، ولیعصر (عج)
رییس محترم سازمان نظام پزشکی قزوین، البرز، تاکستان، آبیگ، بوئین زهرا

با سلام و احترام

عطف به نامه شماره ۴۰۰/۱۰۰۹۶/۱۳ تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۳ معاون محترم درمان وزارت متبوع در خصوص نشر و اجرای راهنمای طبابت بالینی مبتنی بر شواهد با موضوع ابلاغ "راهنمای تجویز داروی میندازول"، به استحضار می‌رساند راهنمای مذکور در آدرس ذیل قابل دسترسی است، لذا در راستای بهره‌مندی و اقدام بر اساس راهنمای ابلاغی، خواهشمند است دستور فرمائید به آدرس ذیل مراجعه نمایند.

استانداردهای دارو استانداردها و راهنماهای بالینی دسترسی سریع <http://vct.qums.ac.ir>

دکتر عبدالله کشاورز
معاون درمان دانشگاه

رونوشت:

۱. مدیر کل محترم بیمه سلامت استان، جهت استحضار
۲. سرپرست محترم مدیریت درمان تامین اجتماعی استان، جهت استحضار
۳. مدیر کل محترم تامین اجتماعی نیروهای مسلح استان، جهت استحضار



جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت درمان

بسمه تعالی

شماره ۴۰۰/۱۰۰۹۶

تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۳

پوست دارد

روسای محترم کلیه دانشگاهها / دانشکده های علوم پزشکی کشور

جناب آقای دکتر میرهاشم موسوی

مدیرعامل محترم سازمان تامین اجتماعی

جناب آقای دکتر محمد مهدی ناصحی

مدیرعامل محترم سازمان بیمه سلامت

جناب آقای دکتر محمد رئیس زاده

رئیس کل محترم سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

جناب آقای دکتر عباس مسجدی آرانی

رئیس محترم سازمان پزشکی قانونی کشور

جناب آقای دکتر حمیدرضا امیر احمدی

مدیرعامل محترم سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح

جناب آقای دکتر سیدحیدر محمدی

معاون محترم وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو

موضوع: ابلاغ راهنمای تجویز داروی مبندازول

با سلام و احترام؛

همانگونه که مطلع می‌باشید یکی از راهکارهایی که برای پیشگیری از افزایش هزینه‌های درمان و تحمیل بار اقتصادی سنگین به نظام سلامت و جامعه در کشورهای مختلف مورد توجه است تدوین و نشر راهنماهای بالینی مبتنی بر شواهد است که به عنوان یکی از محورهای برنامه جامع عدالت، تعالی و بهره‌وری در آموزش علوم پزشکی نیز مورد توجه می‌باشد. در همین راستا معاونت درمان تدوین محصولات دانشی را (راهنمای بالینی، استاندارد، پروتکل و ...) با اولویت خدمات پر تواتر، دارای پوشش بیمه‌ای، هزینه (خدمات، تجهیزات) با حضور جمعی از اساتید حوزه‌های مختلف، در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل و سیاستگذاری و برنامه‌ریزی این امر را عهده‌دار شده است. لذا در راستای پویا سازی ارائه خدمات پزشکی و اجرایی نمودن بر مبنای بند ۵ و ۸-۱ سیاستهای کلی سلامت و ماده ۷۴ قانون برنامه ششم توسعه کشور، مبنی بر اجازه تجویز خدمات و انجام خرید راهبردی




سازمان های بیمه گر بر اساس دستورالعمل ها و راهنماهای بالینی توسط وزارت بهداشت و بر اساس دستورالعمل اجرایی Off label use به شماره ۴۰۰/۷۵۱۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۴/۰۴ «راهنمای تجویز داروی مبندازول» به تصویب رسیده و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است.

بدیهی است ضمن تاکید بر ارائه خدمت در چارچوب استانداردهای مورد تأیید وزارت متبوع، اعلام می گردد دانشگاه/ دانشکده، انجمن ها و سازمان نظام پزشکی میبایست از این محصولات در آموزش های بازآموزی استفاده و سازمان های بیمه گر نیز بر اساس محصولات دانشی اقدام به خرید راهبردی نمایند. امید است با بهره مندی از تلاش جمعی و اطلاع رسانی در این زمینه، شاهد تحولی جدی در حوزه استقرار و بکارگیری راهنماها به منظور ارتقای کیفیت خدمات و کاهش هزینه های غیر ضروری باشیم.

لازم به ذکر است راهنمای داروی مذکور از طریق تارنمای معاونت درمان به آدرس

<http://medcare.behdasht.gov.ir> در دسترس می باشد.

دکتر سعید کریمی
معاون درمان



معاونت درمان

راهنمای تجویز داروی

مبندازول

Mebendazole

تابستان ۱۴۰۳

کمیته مشاوران جهت تنظیم و تدوین:

دکتر علی صفایی متخصص داروسازی بالینی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

دکتر سلام زاده دبیر بورد داروسازی بالینی

دکتر مخدومی دبیر بورد رشته تخصصی بیماری های داخلی

دکتر ولایتی رییس انجمن علمی متخصصین عفونی و گرمسیری ایران

دکتر رضائی دبیر انجمن علمی متخصصین عفونی و گرمسیری ایران

دکتر علیمردانی متخصص داروسازی بالینی دانشگاه علوم پزشکی تهران

نایب‌دیه نهایی:

دکتر فروزانفر عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و مشاور اجرایی معاونت درمان

مشاور: دکتر ساناز بخشنده رییس گروه تدوین استاندارد و راهنمای بالینی معاونت درمان

تحت نظارت فنی:

گروه تدوین استاندارد و راهنمای بالینی

دفتر ارزیابی فن آوری، تدوین استاندارد و تعرفه سلامت

بسمه تعالی
راهنمای تجویز دارو

| نام دارو | محل تجویز و کاربرد دارو | افراد صاحب صلاحیت جهت تجویز | منع مصرف | موارد مصرف | دوز و تواتر مصرف دارو | شرایط تجویز |
|------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--|--|--|-------------|
| مبندازول قرص خوراکی: ۱۰۰ میلی گرمی | بستری و سرپایی | کلیه پزشکان بالینی | -واکنش‌های ازدیاد حساسیت به مبندازول یا هر یک از اجزای فرمولاسیون. -مصرف همزمان با مترونیدازول سیستمیک به جهت افزایش ریسک سندرم استیون جانسون یا نکرولیز سمی اپیدرمال | Ancylostoma duodenale or necator americanus (hookworm) | -بزرگسالان: خوراکی: ۱۰۰ میلی گرم دو بار در روز برای سه روز یا ۵۰۰ میلی گرم تک دوز. تکرار در سه هفته در صورت عدم بهبود با درمان اولیه. - کودکان و نوجوانان: ۱۰۰ میلی گرم دو بار در روز برای سه روز یا ۵۰۰ میلی گرم تک دوز. تکرار در سه هفته در صورت عدم بهبود با درمان اولیه. رژیم سه روزه در بیمارانی که بعد از درمان اولیه بهبودی حاصل نمی شود ارجح است. | |
| | | | | Ascariasis (Ascaris lumbricoides; roundworm) | -بزرگسالان: خوراکی: ۱۰۰ میلی گرم دو بار در روز برای سه روز یا ۵۰۰ | |

| نام دارو | محل تجویز و کاربرد دارو | افراد صاحب صلاحیت جهت تجویز | منع مصرف | موارد مصرف | دوز و تواتر مصرف دارو | شرایط تجویز |
|----------|-------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------------|--|-------------|
| | | | | | <p>میلی گرم تک دوز. تکرار در سه هفته در صورت عدم بهبود با درمان اولیه.</p> <p>- کودکان و نوجوانان: خوراکی : ۱۰۰ میلی گرم دو بار در روز برای سه روز یا ۵۰۰ میلی گرم تک دوز. تکرار در سه هفته در صورت عدم بهبود با درمان اولیه. رژیم سه روزه در بیمارانی که بعد از درمان اولیه بهبودی حاصل نمی شود ارجح است.</p> | |
| | | | | Enterobiasis (pinworm) | <p>-بزرگسالان: خوراکی :۱۰۰ میلی گرم تک دوز تکرار در دو هفته .</p> <p>- کودکان و نوجوانان: ۱۰۰ میلی گرم تک دوز تکرار در دو هفته .</p> | |
| | | | | Trichuris Trichura (whipworm) | <p>- بزرگسالان: خوراکی : ۱۰۰ میلی گرم دو بار در روز برای سه روز یا ۵۰۰ میلی گرم تک دوز؛ تکرار ظرف</p> | |

| شرایط تجویز | دوز و تواتر مصرف دارو | موارد مصرف | منع مصرف | افراد صاحب صلاحیت جهت تجویز | محل تجویز و کاربرد دارو | نام دارو |
|-------------|---|------------|----------|-----------------------------|-------------------------|----------|
| | <p>سه هفته در صورت عدم بهبود درمان اولیه.</p> <p>- کودکان و نوجوانان: داده های موجود برای کودکان کمتر از دو سال محدود است. ۱۰۰ میلی گرم دو بار در روز برای سه روز و تکرار در سه هفته در صورت عدم بهبود درمان اولیه.</p> | | | | | |
| | | | | | | |

بسمه تعالی
راهنمای تجویز off-label دارو

| نام دارو | محل تجویز و کاربرد دارو | افراد صاحب صلاحیت جهت تجویز | منع مصرف | موارد مصرف | دوز و تواتر مصرف دارو | شرایط تجویز |
|------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|---|--|--|---|
| مبندازول قرص خوراکی: ۱۰۰ میلی گرمی | بستری و سرپایی | کلیه پزشکان بالینی | واکنش های ازدیاد حساسیت به مبندازول یا هر یک از اجزای فرمولاسیون. | Capillariasis | - بزرگسالان: خوراکی: ۲۰۰ میلی گرم دو بار در روز برای ۲۰ روز. - کودکان و نوجوانان: ۲۰۰ میلی گرم دو بار در روز برای ۲۰ روز. | |
| | | | | Echinococcus, cystic (alternative agent) | ۴۰-۵۰ mg/kg/day در سه دوز منقسم برای ۳ تا ۶ ماه. | |
| | | | | | Toxocariasis | بزرگسالان: خوراکی: ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلی گرم دو بار در روز برای ۵ روز. -کودکان و نوجوانان: ۱۰۰ تا ۲۰۰ میلی گرم دو بار در روز برای ۵ روز. با این حال ممکن است نیاز به درمان طولانی |

| نام دارو | محل تجویز و کاربرد دارو | افراد صاحب صلاحیت جهت تجویز | منع مصرف | موارد مصرف | دوز و تواتر مصرف دارو | شرایط تجویز |
|----------|-------------------------|-----------------------------|----------|---------------------------------------|--|-------------|
| | | | | | تری باشد. دوره ی درمان مطلوب مشخص نیست. | |
| | | | | Trichinellosis (Trichinella spiralis) | <p>- بزرگسالان: خوراکی: ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلی گرم سه بار در روز برای سه روز. ادامه با دوز ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلی گرم سه بار در روز برای ده روز.</p> <p>- کودکان و نوجوانان: خوراکی: ۲۰۰ تا ۴۰۰ میلی گرم سه بار در روز برای سه روز. ادامه با دوز ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلی گرم سه بار در روز برای ۱۰ روز. در صورت عدم شروع سریع درمان ممکن است نیاز به دوره ی طولانی تری از درمان یا تکرار کورس های درمانی باشد.</p> | |
| | | | | | | |

*** راهنمای تجویز off-label داروی مذکور تا زمان بازنگری به قوت خود باقی است.**

• توصیه ها :

- – نوتروپنی و آگرانولوسیتوز با دوزهای بالا و درمان طولانی گزارش شده است. CBC به صورت دوره ای در بیماران تحت درمان با دوز بالای یا مدت طولانی مانیتور شود.
- – در بیماران با اختلال عملکرد کبدی با احتیاط مصرف شود چرا که می تواند منجر به افزایش مواجهه با دارو شود.
- – ایمنی استفاده مبندازول در نوزادان و شیرخواران داده های موجود محدود می باشد. تشنج در بیماران کمتر از ۱ سال که مبندازول دریافت کرده بودند گزارش شده است ولی رابطه علیتی آن مشخص نیست.
- دارو با یا بدون غذا میتواند تجویز شود.
- قرصهای جویدنی قبل از بلع کاملاً جویده شود.
- میتوان قرص را با ۲-۳ ml آب در یک قاشق حل کرد و ظرف ۲ دقیقه مخلوط نرم و نیمه جامدی حاصل میشود که آماده تجویز خوراکی و بلعیدن است.
- در کل در کودکان زیر ۲ سال داده های بالینی محدودی وجود دارد و جز موارد مصرف Labeled نمی باشد.

• منابع:

Uptodate 2024