



جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت درمان

بسمه تعالی

شماره ۲۱۱۲۹ / ۴۰۰
تاریخ ۱۴۰۳ / ۱۰ / ۱۰
پوست دارد

روسای محترم کلیه دانشگاهها / دانشکده های علوم پزشکی کشور

جناب آقای دکتر محمد مهدی ناصحی

مدیرعامل محترم سازمان بیمه سلامت

جناب آقای دکتر محمد رئیس زاده

رئیس کل محترم سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

جناب آقای دکتر عباس مسجدی آرانی

رئیس محترم سازمان پزشکی قانونی کشور

جناب آقای دکتر حمیدرضا امیر احمدی

مدیرعامل محترم سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح

جناب آقای دکتر سالاری

سرپرست محترم سازمان تامین اجتماعی

جناب آقای دکتر خسرو صادق نیت

مشاور وزیر و مدیر کل محترم حوزه وزارتی

جناب آقای دکتر پیر صالحی

معاون محترم وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو

موضوع: ابلاغ راهنمای تجویز داروی سانیتینیب (نسخه دوم)

با سلام و احترام؛

همانگونه که مطلع می‌باشید یکی از راهکارهایی که برای پیشگیری از افزایش هزینه‌های درمان و تحمیل بار اقتصادی سنگین به نظام سلامت و جامعه در کشورهای مختلف مورد توجه است تدوین و نشر انواع راهنماهای بالینی است که به عنوان یکی از محورهای برنامه جامع عدالت، تعالی و بهره‌وری در آموزش علوم پزشکی نیز مورد توجه می‌باشد. در همین راستا معاونت درمان تدوین و ابلاغ انواع راهنماهای بالینی (شناسنامه و استاندارد خدمات، راهنمای تجویز دارو، پروتکل تشخیص و درمان بیماری و...) را با اولویت خدمات پر تواتر، پر هزینه (خدمات، تجهیزات)، دارای پوشش بیمه‌ای، با حضور جمعی از اساتید حوزه‌های مختلف، در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تشکیل و سیاستگذاری و برنامه‌ریزی این امر را عهده‌دار شده است. لذا در



جمهوری اسلامی ایران
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

معاونت درمان

بسمه تعالی

شماره ۲۱۱۲۹/۰۴۰۰
تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۱۰
پوست دارد


راستای پویا سازی ارائه خدمات پزشکی و اجرایی نمودن بر مبنای بند ۵ و ۸-۱ سیاستهای کلی سلامت و ردیف ۲-۳ بند (الف) ماده ۶۹ و ردیف ۱ و ۲ ماده ۷۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، مبنی بر اجازه تجویز خدمات و انجام خرید راهبردی سازمان های بیمه گر بر اساس دستورالعمل ها و راهنماهای بالینی توسط وزارت بهداشت « راهنمای تجویز داروی سانیتینیب (نسخه دوم) » به تصویب رسیده و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا است.

بدیهی است ضمن تاکید بر ارائه خدمت در چارچوب استانداردهای مورد تائید وزارت متبوع، اعلام می گردد دانشگاه/ دانشکده، انجمن ها و سازمان نظام پزشکی میبایست از این راهنماها در آموزش های بازآموزی استفاده و سازمان های بیمه گر نیز بر اساس محصولات دانشی اقدام به خرید راهبردی نمایند. امید است با بهره مندی از تلاش جمعی و اطلاع رسانی در این زمینه، شاهد تحولی جدی در حوزه استقرار و بکارگیری راهنماها به منظور ارتقای کیفیت خدمات و کاهش هزینه های غیر ضروری باشیم.

لازم به ذکر است راهنمای تجویز داروی مذکور از طریق تارنمای معاونت درمان به آدرس

<http://medcare.behdasht.gov.ir> در دسترس می باشد.

دکتر سعید کریمی
معاون درمان



معاونت درمان

راهنمای تجویز داروی

سُنیتینیب

Sunitinib

نسخه دوم

زمستان ۱۴۰۳

کمیته مشاوران جهت تنظیم و تدوین:

دکتر خاطره سادات موسوی

دکتر محدثه شاهین

دکتر لیلا مودب شعار

دکتر مهسا مشتاقیان

دکتر خاطره بابایی

دکتر نسرین بیات

خانم ساقی نوروژی

با همکاری:

دکتر کامبیز نوین

دکتر امیرعباس رشیدی

دکتر امیرحسین میر حسینی

دکتر پرستو حاجیان

دکتر حجت الله شهبازیان

دکتر مونا ملک زاده

دکتر فرزانه اشرفی

دکتر شراره سیفی

دکتر محمد رضا رستمی

با همکاری:

مرکز مدیریت پیوند و درمان بیماری ها معاونت درمان

نایب‌دیده نهایی:

دکتر موسوی دبیر بورد رشته فوق تخصصی خون و سرطان

دکتر فرانش دبیر انجمن علمی خون و سرطان کودکان ایران

دکتر ابوالقاسمی دبیر بورد رشته فوق تخصصی خون و سرطان کودکان

دکتر حسام هاشمیان جانشین دبیر بورد رشته تخصصی چشم پزشکی

دکتر فرهان دبیر بورد رشته تخصصی رادیوانکولوژی

تحت نظر:

دکتر سعید کریمی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و معاون محترم درمان

مشاور: دکتر ساناز بخشنده رییس گروه تدوین استاندارد و راهنمای بالینی معاونت درمان

تحت نظارت فنی:

گروه تدوین استاندارد و راهنماهای سلامت

دفتر ارزیابی فن آوری، تدوین استاندارد و تعرفه سلامت

بسمه تعالی
راهنمای تجویز داروی سانیتینیب

نام دارو	محل تجویز و کاربرد دارو	افراد صاحب صلاحیت جهت تجویز	اندىکاسیون	کنترا اندىکاسیون	دوز و تواتر مصرف دارو	شرایط تجویز
سانیتینیب	مراکز بستری و سرپایی شیمی درمانی	متخصص رادیوانکولوژی (رادیوتراپی) فوق تخصص خون و سرطان	در درمان تومورهای استرومال دستگاه گوارش (GIST) موضعی غیر قابل جراحی (اولیه یا عود کرده) و متاستاتیک در خط دوم قابل تجویز است.	حساسیت به دارو	با دوز ۵۰ میلی گرم روزانه در دوره های ۶ هفته ای (با ۴ هفته مصرف و ۲ هفته استراحت) یا با دوز ۳۷/۵ میلی گرم روزانه بدون وقفه، تا زمان پیشرفت بیماری یا بروز عارضه دارویی	مصرف دارو با یا بدون غذا اجتناب از مصرف گریپ فروت
			در موارد RCC غیر قابل جراحی، عود کرده یا متاستاتیک (clear cell and non-clear cell) به عنوان خط اول و پس از آن تا زمان پیشرفت بیماری یا بروز عوارض دارویی قابل تجویز است.		با دوز ۵۰ میلی گرم روزانه در دوره های ۶ هفته ای (با ۴ هفته مصرف و ۲ هفته استراحت) یا با دوز ۵۰ میلی گرم روزانه در دوره های ۳ هفته ای (با ۲ هفته مصرف و ۱ هفته استراحت)	

شرایط تجویز	دوز و تواتر مصرف دارو	کنترا اندیکاسیون	اندیکاسیون	افراد صاحب صلاحیت جهت تجویز	محل تجویز و کاربرد دارو	نام دارو
	با دوز ۳۷/۵ میلی گرم روزانه بدون وقفه، تا زمان پیشرفت بیماری یا بروز عارضه دارویی		تومور نورواندوکراین پانکراس پیشرفته: داروی سانتینیب در درمان تومور نورواندوکراین پانکراس (well differentiated) متاستاتیک یا locally advanced که غیر قابل جراحی و پیشرونده و یا علامتدار است، قابل تجویز است. در درمان فئوکروموسیتوما/پاراگانگلیوما غیر قابل جراحی یا متاستاتیک کاربرد دارد.			
	با دوز ۵۰ میلی گرم روزانه در دوره های ۶ هفته ای (با ۴ هفته مصرف و ۲ هفته استراحت) یا با دوز ۳۷/۵ میلی گرم روزانه بدون وقفه، تا زمان پیشرفت بیماری یا بروز عارضه دارویی		در سرطان تیروئید پیشرفته یا عود کرده یا متاستاتیک مقاوم کاربرد دارد.			
	با دوز ۳۷/۵ میلی گرم روزانه بدون وقفه، تا زمان		در درمان سارکوم بافت نرم متاستاتیک نظیر alveolar soft part sarcoma.			

شرایط تجویز	دوز و تواتر مصرف دارو	کنترا اندیکاسیون	اندیکاسیون	افراد صاحب صلاحیت جهت تجویز	محل تجویز و کاربرد دارو	نام دارو
	پیشرفت بیماری یا بروز عارضه دارویی		آنژیوسارکوما، solitary fibrous tumor، کندروسارکوم میکسوئید خارج استخوانی			
	با دوز ۵۰ میلی گرم روزانه در دوره های ۶ هفته ای (با ۴ هفته مصرف و ۲ هفته استراحت) تا پیشرفت بیماری یا بروز عارضه		در درمان کارسینومای تیموس در خط دوم			
	بر اساس نظر پزشک معالج		بیماری عروق شبکیه	متخصص چشم پزشکی		