





معاونت محترم درمان استان قزوين

معاونت محترم بهداشت استان قزوين

ریاست محترم مرکز آموزشی درمانی ولایت/ بوعلی/ شهید رجایی/کوثر/قدس/22 بهمن

سرپرست محترم بیمارستان شفاء تاکستان/ امیرالمومنین/ شهدای آبیک

ریاست محترم بیمارستان رحیمیان/ تامین اجتماعی تاکستان/تامین اجتماعی رازی/ دهخدا/پاستور/ ارتش/ مهرگان/ ولیعصر آبیک

مدیریت محترم شبکه بهداشت و درمان شهرستان بویین زهرا/تاکستان/آبیک/البرز/آوج

رياست محترم سازمان نظام يزشكي استان قزوين

رياست محترم انجمن داروسازان استان قزوين

موسس و مسئول فني محترم كليه داروخانه هاي استان

مديريت محترم كليه شركت هاي يخش استان

با سلام و احترام

با توجه به نامه شماره ۶۵۸/۵۲۹۲۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ مدیرکل محترم دفتر نظارت و پایش مصرف فرآوردههای سلامت، به پیوست اطلاع به روز رسانی هشدارهای ایم ی واکسن آبله مرغان جهت استحضار و اطلاع رسانی به حضور ایفاد می گردد.









شماره ۱۴۰۴/۱۰/۵۰۹۱ تاریخ تاریخ دارد

مدیر کل دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده های سلامت محور مدیر کل محترم اداره کل امور دارو و مواد تحت کنترل موضوع: ارسال Safety Notification در خصوص فرآورده Varivax

با سلام و احترام

به پیوست یک عدد Safety Notification در خصوص فرآورده Varicella Virus Vaccine Live با نام تجاری Varivax دریافت شده از طرف کمپانی MSD ارسال می گردد.

بدینوسیله به اطلاع میرساند که کمیته PRAC در جلسه مورخ ۷ تا ۱۰ جولای Volume 10 توصیههایی در خصوص فرآورده Volume 10 ارائه نموده است که در تاریخ ۲۰ آگوست Volume 10 در وبسایت Volume 10 منتشر گردیده است.

مطابق این توصیهها، لازم است بخش ۴.۴ (هشدارها و احتیاطات ویژه مصرف) در خلاصه ویژگیهای فرآورده (SmPC) و اکسن Varivax بهروزرسانی گردد. و همچنین برگه راهنمای بیمار (Package Leaflet) واکسن کودند.

جزئیات کامل توصیهها و متن نهایی بهروزرسانی شده و مستندات مربوطه از طریق لینکهای ذکر شده در نامه پیوست در دسترس میباشند.

مراتب جهت استحضار و دستور مقتضى ارسال مى گردد.

دكتر اميراحمد سالاريان

شرکت بهستان دارو (سهامی خاس) با سپاس دکتر حورا فاتحی میرتول فنی

2. Varivax

Summary of product characteristics

4.4 Special warnings and precautions for use

Encephalitis

Encephalitis has been reported during post-marketing use of live attenuated varicella vaccines. In a few cases fatal outcomes have been observed, especially in patients who were immunocompromised (see section 4.3). Vaccinees/parents should be instructed to seek prompt medical attention if they/their child experience, after vaccination, symptoms suggestive of encephalitis such as loss or reduced levels of consciousness, convulsions or ataxia accompanied by fever and headache.

New product information wording – Extracts from PRAC recommendations on signals EMA/PRAC/224803/2025

Page 10/13

4.8 Undesirable effects

Post-Marketing Surveillance

Infections and infestations: Encephalitis*[‡], Pharyngitis, Pneumonia*, Varicella (vaccine strain), Herpes zoster*[‡], Aseptic meningitis[‡]

- * These selected adverse events reported with varicella vaccine (live) (Oka/Merck strain) are also a consequence of wild-type varicella infection. There is no indication of an increased risk of these adverse events following vaccination compared with wild-type disease from active post-marketing surveillance studies or passive post-marketing surveillance reporting (see section 5.1).
- * See section c.
- c. Description of selected adverse reactions

Complications associated with varicella

Complications of varicella from vaccine strain, including herpes zoster and disseminated disease such as aseptic meningitis and encephalitis, have been reported in immunocompromised and immunocompetent individuals. A few cases of encephalitis with a fatal outcome have been observed following vaccination with live attenuated varicella vaccines, especially in immunocompromised people (see section 4.4).

Package leaflet

4 Possible side effects

Side effects that have been reported during marketed use of VARIVAX include:

- Infection or inflammation of the brain (encephalitis) has been observed following vaccination with live attenuated varicella vaccines. In a few cases, this condition has been fatal, especially in people with weakened immune systems (as noted in section 2, Varivax must not be used in patients with weakened immune systems). Seek immediate medical attention if you or your child develop loss or reduced levels of consciousness, convulsions or loss of control of bodily movements, accompanied by fever and headache, as these might be a sign of infection or inflammation of the brain. Inform your doctor or pharmacist that you or your child received a live attenuated varicella vaccine.
- illnesses affecting the nervous system (brain and/or spinal cord) such as sagging facial muscles
 and drooping eyelid on one side of the face (Bell's palsy), walking unsteadily, dizziness, tingling
 or numbness of the hands and feet, inflammation of the brain (encephalitis), inflammation of the
 coverings of the brain and spinal cord not caused by bacterial infection (aseptic meningitis),
 fainting
- [...]