



سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

باسمه تعالی

شماره:

د/۱۰۰/۷۰/۸۸۹۳

تاریخ:

۱۴۰۴/۰۹/۲۴

ریاست محترم هیات مدیره نظام پزشکی

موضوع: اطلاعیه شماره ۱۳۷ - هشدار در خصوص مصرف همزمان دسته دارویی اپیوئیدها و بنزودیازپین ها

با سلام و احترام

به پیوست نامه شماره ۱۴۰۴/ص/۳۳۶۰۱ مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با موضوع "اطلاع رسانی اطلاعیه شماره ۱۳۷ - هشدار در خصوص مصرف همزمان دسته دارویی اپیوئیدها و بنزودیازپین ها" جهت استحضار و هرگونه بهره برداری ایفاد می گردد. پیوست در مراجع است.

دکتر بابک شکارچی
معاون فنی و نظارت



شماره: ۶۵۸/۵۴۵۹۵
تاریخ: ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ ۱۲:۴۴
پیوست: دارد
سرمایه گذاری برای تولید

معاونین محترم غذا و دارو دانشگاه/دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی سراسر کشور

موضوع: اطلاعیه شماره ۱۳۷ هشدار در خصوص مصرف همزمان دسته دارویی اپیوئیدها و بنزودیازپین ها

با سلام و احترام؛

پیرو دریافت گزارش عوارض جدی تهدیدکننده حیات با مصرف همزمان داروهای تزریقی دیازپام و مورفین سولفات، به پیوست اطلاعیه شماره ۱۳۷ این دفتر با عنوان " هشدار در خصوص مصرف همزمان دسته دارویی اپیوئیدها و بنزودیازپین ها " جهت استحضار و اطلاع رسانی گسترده به همه مراکز دارویی، بهداشتی و درمانی تحت پوشش آن معاونت خدمتتان ارسال می شود.

دکتر نازیلا یوسفی
مدیر کل دفتر نظارت و پایش
مصرف فرآورده های سلامت

رونوشت :

دبیر محترم شورای عالی بیمه سلامت و مدیر کل دفتر برنامه ریزی و سیاست گذاری بیمه سلامت (جناب آقای معنوی): جهت استحضار و دستور اقدام لازم

جناب آقای دکتر عبدالهی اصل (مدیر کل امور دارو و مواد تحت کنترل): جهت استحضار و دستور اقدام لازم
سرپرست مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان (جناب آقای دکتر غفارزاده): جهت استحضار و دستور اقدام لازم
سرکار خانم زهرا کرمی (کاردان اداره راهبری اسناد و مدارک)



ساختمان مرکزی: تهران، خیابان انقلاب، روبروی درب اصلی دانشگاه تهران، خیابان فخر رازی، پلاک ۳۰
تلفن: ۰۲۱-۶۱۹۲۷۰۰۰ نمابر: ۰۲۱-۶۶۴۰۵۵۷۱ کدپستی: ۱۳۱۴۷۱۵۳۱۱ <https://fda.gov.ir> info@fda.gov.ir
اداره کل تجهیزات و ملزومات پزشکی: تهران، خیابان انقلاب، خیابان خارک، پلاک ۲۹ تلفن: ۰۲۱-۶۳۴۲۰۰۰۰ کدپستی: ۱۱۳۳۷۶۷۴۱۳

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ (۱۰:۲۴)
شماره: ۱۴۰۴/ص/۳۳۶۰۱
پیوست: ندارد



«سرمايه‌گذاري براي توليد»-
«همه براي ايران جوان»-

معاونت غذا و دارو

دبيرخانه: سازمان نظام پزشکی کل کشور

شماره نامه: ۴۸۵۴۷ / ۱۰ / ۱۰۰

تاریخ: ۱۴۰۴/۰۸/۰۵

رئیس محترم مرکز بهداشت ...

مدیر محترم شبکه بهداشت و درمان ...

رئیس محترم مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی ...

رئیس محترم بیمارستان ...

رئیس محترم مرکز جراحی محدود ...

مؤسس محترم داروخانه ...

سرپرست محترم داروخانه های دانشکده داروسازی

مدیر عامل محترم شرکت توزیع سراسری ...

موضوع: اطلاع رسانی اطلاعیه شماره ۱۳۷ هشدار درخصوص مصرف همزمان دسته دارویی اپیوئیدها و بنزودیازپین ها

با سلام و احترام

به پیوست نامه شماره ۶۵۸/۵۴۵۹۵ به تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ مدیر کل محترم دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده های سلامت، درخصوص اطلاعیه شماره ۱۳۷ آن دفتر با عنوان "هشدار درخصوص مصرف همزمان دسته دارویی اپیوئیدها و بنزودیازپین ها" پیرو دریافت گزارش عوارض جدی تهدیدکننده حیات با مصرف همزمان داروهای تزریقی دیازپام و مورفین سولفات، اطلاع رسانی می گردد. شایسته است دستور فرمایید، درخصوص اطلاع رسانی به کلیه همکاران گروه پزشکی آن بیمارستان/مرکز، اقدام لازم صورت گیرد.

دکتر جمشید سلام زاده
معاون غذا و دارو دانشگاه

رونوشت:

سرکار خانم دکتر نازیلا یوسفی مدیر کل محترم دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده های سلامت سازمان غذا و دارو

جناب آقای دکتر سید سعید هاشمی نظری معاون محترم بهداشت دانشگاه

جناب آقای دکتر رضا زندی معاون محترم درمان دانشگاه: جهت دستور اطلاع رسانی به کلیه مراکز درمانی تحت پوشش شامل

مطب پزشکان و درمانگاهها و ...

سرکار خانم دکتر ندا رونده مدیر محترم نظارت بر امور دارویی

جناب آقای حسین فدائی رابط محترم روابط عمومی: جهت درج در سایت معاونت

تهران، خیابان ولیعصر، روبروی پارک ساعی، خیابان آبخار، پلاک ۴۷، کدپستی: ۱۴۳۴۷۴۳۳۹۷، تلفن: ۸۴۲۴۸-۰۲۱، فکس: ۸۸۶۶۲۳۳۴-۵، ایمیل:

Fdo@sbmu.ac.ir وبسایت: https://Fdo.sbmu.ac.ir

پیرو دریافت گزارش عوارض جدی به دنبال مصرف همزمان داروهای تزریقی دیازپام و مورفین سولفات که به علت عارضه ایست تنفسی منجر به مرگ بیمار شد و به منظور پیشگیری از عوارض مشابه، موارد ذیل را در خصوص هشدارهای مصرف همزمان اپیوئیدها و بنزودیازپین‌ها به اطلاع همکاران محترم جامعه پزشکی می‌رساند:

بر اساس منابع علمی، مصرف همزمان داروهای اپیوئیدی (مانند مورفین، اکسی‌کودون، فنتانیل و...) با داروهای بنزودیازپین (مانند دیازپام، لورازپام، کلونازپام و...) یا سایر داروهای تضعیف‌کننده سیستم عصبی مرکزی (از جمله الکل، داروهای خواب‌آور و آنتی‌هیستامین‌های نسل اول)، می‌تواند منجر به عوارض جدی و تهدیدکننده حیات گردد.

افراد پرخطر

- سالمندان
- بیماران مبتلا به بیماری‌های مزمن ریوی (مانند COPD و آسم)
- بیماران با نارسایی کلیوی یا کبدی
- بیماران با مصرف همزمان الکل یا سایر داروهای تضعیف CNS

توصیه‌های بالینی برای جامعه پزشکی

۱. تا حد امکان از تجویز همزمان اپیوئیدها و بنزودیازپین‌ها یا سایر داروهای تضعیف CNS خودداری کنید.
۲. در صورت ضرورت تجویز همزمان، از پایین‌ترین دوز مؤثر و کوتاه‌ترین مدت درمان استفاده کنید.
۳. پایش دقیق بیمار:
 - وضعیت تنفسی و سطح هوشیاری بیمار را به‌طور منظم و دقیق به ویژه در شروع درمان و پس از افزایش دوز کنترل کنید.
 - علائم سدیشن شدید، خواب‌آلودگی غیرطبیعی، یا کاهش سطح هوشیاری باید فوراً بررسی و مدیریت شوند.
۴. بیماران و مراقبین بیمار را در مورد علائم هشداردهنده خطر (مانند اختلال در تنفس، سرگیجه شدید، خواب‌آلودگی بیش از حد) آموزش دهید و توصیه کنید مصرف الکل یا سایر داروهای تضعیف CNS را قطع کنند.

منبع

- UpToDate 2025