



تاریخ: ۱۴۰۴/۱۰/۲۰

شماره: ۲۸/۵۳/۴۸۱۸۴۷

پیوست: دارد

ساعت: ۱۰:۴۰

معاونت محترم درمان استان قزوین

معاونت محترم بهداشت استان قزوین

ریاست محترم مرکز آموزشی درمانی ولایت / بوعلی / شهید رجایی / کوثر / قدس / ۲۲ بهمن

سرپرست محترم بیمارستان شفاء ناکستان / امیرالمومنین / شهدای آبیک

ریاست محترم بیمارستان رحیمیان / تامین اجتماعی ناکستان / تامین اجتماعی رازی / دهخدا / پاستور / ارتش / مهرگان / ولیعصر

آبیک

مدیریت محترم شبکه بهداشت و درمان شهرستان بوبین زهرا / ناکستان / آبیک / البرز / آوج

ریاست محترم سازمان نظام پزشکی استان قزوین

ریاست محترم انجمن داروسازان استان قزوین

موسس و مسئول فنی محترم کلیه داروخانه های استان

مدیریت محترم کلیه شرکت های پخش استان

موضوع: اطلاعیه شماره ۱۴۳ دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده های سلامت با عنوان هشدارهای ایمنی مصرف داروی بوپروپیون /

نالتروکسن

با سلام و احترام

با توجه به نامه شماره ۶۵۸/۷۴۳۵۴ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۵ مدیرکل محترم دفتر نظارت و پایش مصرف

فرآورده های سلامت، به پیوست اطلاعیه شماره ۱۴۳ آن دفتر با عنوان هشدارهای ایمنی مصرف داروی بوپروپیون /

نالتروکسن جهت استحضار، اطلاع رسانی و آموزش به کلیه اعضا به حضور ایفاد می گردد.

دکتر فرزانه حامدی وفا
معاون غذا و دارو دانشگاه

به اطلاع جامعه محترم پزشکی می‌رساند، دفتر نظارت و پایش مصرف فرآورده‌های سلامت، گزارش‌هایی مبنی بر عوارض ناخواسته به دنبال مصرف فرآورده قرص خوراکی ترکیبی بوپروپیون / نالتراکسون، دریافت نموده است که با توجه به اینکه در بسیاری از موارد با به‌کارگیری نکات ایمنی توصیه شده در منابع علمی، احتمال وقوع عارضه ناخواسته در بیماران کاهش می‌یابد، موارد زیر را به اطلاع همکاران محترم می‌رساند.

• مصرف بیش از حد تصادفی مواد اوپیوید:

بیمارانی که با داروی نالتراکسون درمان می‌شوند، ممکن است به دوزهای پایین‌تر مواد اوپیوید نسبت به میزان مصرف قبلی پاسخ نشان دهند. این موضوع می‌تواند منجر به مسمومیت با مواد اوپیوید شود که به طور بالقوه تهدید کننده حیات است. به بیماران هشدار دهید که هرگونه تلاش برای غلبه بر بلوک اوپیویدی در طول درمان با نالتراکسون خطرناک است و می‌تواند به طور بالقوه منجر به مصرف بیش از حد کشنده مواد اوپیوید شود. انسداد رقابتی گیرنده مواد اوپیوید که توسط نالتراکسون ایجاد می‌شود، در حضور مقادیر زیادی از مواد اوپیوید به طور بالقوه قابل برطرف شدن است. در صورت نیاز به درمان مزمن با مواد اوپیوید، مصرف داروی ترکیبی بوپروپیون / نالتراکسون باید متوقف شود. اگر نیاز به درمان متناوب با مواد اوپیوید باشد، به طور موقت مصرف بوپروپیون / نالتراکسون را قطع کنید و ممکن است دوزهای پایین‌تری از مواد اوپیوید مورد نیاز باشد.

• ترک حاد مواد اوپیوید:

مصرف داروی بوپروپیون / نالتراکسون ممکن است علائم ترک حاد را در بیماران وابسته به مواد اوپیوید تسریع کند. برای بیمارانی که قبلاً به مواد اوپیوید کوتاه اثر (از جمله ترامادول) وابسته بوده‌اند، حداقل ۷ تا ۱۰ روز فاصله زمانی بدون مواد اوپیوید توصیه می‌شود؛ در بیمارانی که در حال تغییر رژیم درمانی از بوپرنورفین یا متادون هستند، فاصله زمانی بدون مواد اوپیوید تا ۲ هفته را در نظر بگیرید.

• سمیت کبدی:

مواردی از هپاتیت، اختلال عملکرد قابل توجه کبد و افزایش گذرا و بدون علامت ترانس آمیناز کبدی با مصرف نالتراکسون مشاهده شده است. در صورت بروز علائم/ نشانه‌های هپاتیت حاد، درمان را قطع کنید. پزشکان باید توجه داشته باشند که افزایش ترانس آمینازها ممکن است ناشی از بیماری کبدی الکلی قبلی، عفونت هپاتیت B و یا C یا مصرف همزمان سایر داروهای هپاتوتوکسیک باشد. ترک ناگهانی مواد اوپیوید نیز ممکن است منجر به آسیب حاد کبدی شود.